


糖尿病治療について

＜糖尿病の一般治療＞（対処療法的）



血糖降下剤の種類

スルホニル尿素薬：インスリンの分泌を促進する

インスリン作用増強剤：インスリン抵抗性改善薬

α グルコシダーゼ阻害薬：糖の消化・吸収を遅くする

ビグアナイド薬：糖の代謝を促進する

チアゾリジン薬：インスリンの働きを高める

《丹羽クリニックにおける糖尿病の治療方針》

(体質改善・根本治療)

全身状態を診て、患者さんごとの身体の弱点を探り、その弱点を補い、強化し、その人が本来持つ自然治癒力を引き出すことで、糖尿病を克服できる体質へと変える。対処療法的な医薬品は原則として不使用。

漢方薬・正體治療・ビタミン・ミネラル療法・温熱療法・調圧免疫療法融合的な治療を行う。

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ①漢方薬 | : 体質改善、血糖降下作用 |
| ②正體 | : 全身の血流を改善、 糖代謝・脂質代謝を改善 |
| ③ビタミン・ミネラル | : 血糖降下作用 |
| ④温熱療法 | : 末梢循環の改善 |
| ⑤調圧免疫療法 (アスクレーム) | : 自己治癒能力の改善 |

糖尿病の症状改善例

43才男性

- ① 調圧免疫療法 : 自己治癒能力の改善
(アスクレルーム)
- ② 漢方薬 : 体質改善、血糖降下作用
- ③ ビタミン・ミネラル : 血糖降下作用

| | 血糖値(mg/dl) | HbA1c (%) | CRP | ケトン体 | 尿糖 |
|-------|------------|-----------|------|------|----|
| 初診時 | 201 | 9.0 | 2.77 | — | 4+ |
| 2週間後 | 104 | 8.2 | | | 1+ |
| 4週間後 | 117 | 7.9 | 0.79 | — | — |
| 6週間後 | 106 | 7.0 | 1.19 | — | — |
| 9週間後 | 100 | 6.2 | 1.26 | — | — |
| 11週間後 | 90 | 5.9 | | — | — |
| 14週間後 | 99 | 5.3 | 1.02 | — | — |
| 17週間後 | 109 | 5.3 | | — | — |
| 20週間後 | 102 | 5.4 | 1.04 | — | — |

